

ATMINTINĖ PACIENTUI

PASIRUOŠIMAS EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIJAI

Kad procedūra būtų sėkminga, būtina, kad Jūs griežtai laikytumėtės toliau pateiktų nurodymų:

- Nieko nevalgyti ir negerti ne mažiau kaip 6 val. iki procedūros;
 - Bent 2 val. prieš tyrimą negalima rūkyti;
 - Galima išgerti savo įprastus vaistus su nedideliu kiekiu vandens;
 - Tyrimo dieną negalima gerti skrandžio rūgštingumą mažinančių vaistų;
 - Pacientui, vartojančiam kraujo krešėjimą mažinančius vaistus, atliekama tik diagnostinė endoskopija. Jeigu jos metu paaiškėja, kad reikalinga intervencija (biopsija, polipo šalinimas ir pan.), paskiriama pakartotina endoskopija.
-

ATMINTINĖ PACIENTUI

PASIRUOŠIMAS KOLONOSKOPIJOS TYRIMUI

Kad žarnynas būtų efektyviai išvalytas, o procedūra sėkminga, būtina, kad Jūs griežtai laikytumėtės toliau pateiktų nurodymų:

- Dieną prieš numatomą tyrimą galite suvalgyti lengvus pusryčius.
 - Vaistinėje įsigykite vidurius laisvinančiųjų vaistų (pvz.: Picoprep, Eziclen, Fortrans arba kt.). Preparatą paruoškite ir naudokite taip, kaip nurodyta informaciniame lapelyje. Gautą tirpalą išgerti rekomenduojama dviejų dienų dozių režimu, geriausia paskutinę vaisto dozę suvartoti likus 4-6 val. iki procedūros.
Jei kolonoskopija atliekama ryte (8-12 val.), žarnyno paruošimui skirtą tirpalą reikia išgerti išvakarėse. Svarbu, kad paskutinis tirpalo kiekis būtų suvartotas likus ne mažiau kaip 6 val. iki tyrimo.
Jei kolonoskopija atliekama per pietus (12-15 val.), pusę tirpalo kiekio reikia išgerti išvakarėse, kitą pusę - tyrimo dieną anksti ryte ir pabaigti gerti likus 4 valandoms iki tyrimo.
 - 3 dienas iki procedūros negalima vartoti: patiekalų su riešutais, grūdais, sėklomis.
 - Jeigu nuolat geriate vaistus dėl lėtinės ligos, tyrimo dienos rytą juos kaip visada išgerkite su nedideliu kiekiu vandens.
 - Prieš numatomą procedūrą nenaudoti antikoaguliantų ar antiagregantų, geležies preparatų.
 - Jeigu tyrimas bus atliekamas su intravenine nejautra, būtina atvykti su lydinčiu asmeniu, po tyrimo negalima vairuoti.
-